

Frühjahr 2012/2013



HORST GEWIEHS GmbH

BLUMENZIEBEL-IMPORT UND GROSSHANDEL

37285 Wehretal

**Acidanthera** siehe **Gladiolus callianthus**

## Agapanthus (Schmucklilie, Liebesblume) ♂&♀

Prächtige Solitärpflanzen für Kübel und große Töpfe mit dekorativem Blattwerk und hübschen Doldenblüten auf starken Stielen. Lieferung ab März. Im Winter frostfrei halten.

**Blüte August bis September | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08117	<b>Blue Giant</b> , blau 2-3 Augen	70-90	I
08124	<b>White Giant</b> , weiß, 2-3 Augen	70-90	I

## Allium (Zierlauch) D

Gartenlauch, eine Pflanzengattung, zu der auch unsere Küchenzwiebel gehört. Sehr anspruchslos, jedoch ist ein sonniger Standort am besten.

**Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08142	<b>moly (Goldlauch)</b> (syn. <i>A. luteum</i> ), <b>blüht im Juni</b> mit goldgelben Doldenblüten über auffällig breiten, blaugrünen Blättern. Sehr guter Verwilderer	25	5/+
08145	<b>neapolitanum Grandiflorum (großblumiger Neapellauch)</b> , hat schöne reinweiße Blütenköpfe <b>Blütezeit Juni</b>	60	4/+
08147	<b>oreophilum</b> (syn. <i>A. ostrowskianum</i> ), trägt recht große karminrosa Blütendolden im Juni-Juli und eignet sich besonders für Steingärten. Sonniger Standort bevorzugt	20	4/+



Agapanthus Blue Giant



Agapanthus White Giant



Allium moly

## Alocasia (Zehrwurz, Elefantenohr, Tara)

Alocasia ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Aronstabgewächse. Beheimatet ist Alocasia im tropischen Asien, wo sie als eine wichtige Nahrungspflanze gilt und das seit mehr als 2.000 Jahren. Vom „Taro“, wie die Pflanze in Asien genannt wird, werden vorwiegend die stärkehaltigen Knollen wie Kartoffeln genutzt.

Es sind große, immer grüne, ausdauernde, krautige Pflanzen, wobei Blätter und Blütenstände gleichzeitig vorhanden sind. Wie bei allen Aronstabgewächsen besteht der Blütenstand aus einem Blüten-schaft, einem Hochblatt (Spatha) und dem Kolben.

Zum Wachsen benötigen Alocasia tropische Bedingungen, wie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls lieben Sie diffuses Licht (Regenwaldpflanze) und benötigen viel Nährstoffe.

**Liefertermin ab Mitte Februar bis April**

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08132	<b>esculenta Coco(Colocasia)</b> , Heimat Sri Lanka, grünlaubig	80-100	25/ +

## Amaryllis belladonna (Belladonnenlilie)

Im Frühsommer erscheinen 40-50 cm lange, riemenartige Blätter, die kurz darauf wieder absterben. Einige Wochen später, etwa ab August erscheint dann der blattlose Blüten-schaft. Amaryllis belladonna verlangt einen sehr warmen geschützten Standort, evtl. Südmauer, sowie einen kräftigen, wasser-durchlässigen, sandig/lehmigen Boden. In einer Grube ca. 25 cm tief pflanzen, benötigt 1-2 Jahre bis zur ersten Blüte. Im Winter durch Abdecken gut vor Frost schützen.

**Liefertermin ab Mitte Februar**

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08220	<b>belladonna</b> , große rosa amaryllisähnliche Blüten	50-60	18/ 20



*Amaryllis neapolitanum Grandiflorum*



*Amaryllis oreophilum*



*Alocasia esculenta Coco*

## Anemonen coronaria (Kronenanemone)

Die Knollen sollten vorzugsweise vor dem Auslegen 12 Stunden in lauwarmen Wasser aufquellen, was die Wurzelbildung und den Austrieb fördert.

**Blütezeit:** Mai bis September | **Liefertermin** ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
<b>de Caen – Einfache Gartenanemonen</b>			
08415	<b>Bicolor</b> , rot/weiß	25	6/7
08420	<b>Hollandia</b> , scharlachrot	25	6/7
08432	<b>Mr. Fokker</b> , leuchtend blau	25	6/7
08426	<b>Sylphide</b> , violett	25	6/7
08438	<b>The Bride</b> , reinweiß	25	6/7
08411	<b>De Caen</b> , einfache Prachtmischung	25	6/7
<b>St. Brigid – Gefüllte Gartenanemonen</b>			
08470	<b>Admiral</b> , violett	25	6/7
08476	<b>Gouverneur</b> , rot	25	6/7
08482	<b>Lord Lieutenant</b> , blau	25	6/7
08488	<b>Mount Everest</b> , weiß	25	6/7
08461	<b>St. Brigid</b> , gefüllte Prachtmischung	25	6/7

## Anemone (Herbstanemone)

Diese wunderschönen, anmutigen Herbstanemonen mit ihren großen Schalenblüten blühen vom Frühherbst bis in den Spätherbst hinein. Da sie etwas Frostempfindlich sind, sollten sie vorsichtigerweise vor dem Winter mit Laub oder Torf abgedeckt werden.

Haben diese Anemonen erst einmal Fuß gefasst, können sie sehr alt an ihrem Standort werden. Vermehrung ist möglich durch Wurzelschnittlinge.

**Blütezeit** August bis Oktober | **Liefertermin** ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08407	<b>hupehensis</b> , Herbstanemone, rosa,	<b>getopft</b> 50	T 9



*Amaryllis belladonna*



*Anemone de Caen Bicolor*



*Anem. de Caen einf. Prachtmischung*

## Anemone sylvestris (Großes Windröschen, Hainanemone)

hat seinen Naturstandort an sonnigen Wald- und Waldrandlagen, Böschungen usw. auf warmen, tiefgründigen Böden. Die einzelnstehende, große weiße Blüte ist leicht nickend und außen seidig behaart. Blätter dunkelgrün. In mildem Klima sich stark durch Wurzelausläufer ausbreitend.

**Blütezeit: Mai bis Juni | Liefertermin ab Ende März**

Art-Nr.	Sorte		Höhe cm	Größe
08320	<b>sylvestris</b> , reinweiß	<b>getopft</b>	15-30	T 9

## Anomatheca (Lapeirousia, Gladiolus laxus)

Die in Südafrika beheimatete Art besitzt kleine Knollen mit filziger Schale und 15-20 cm lange, schwertförmige Blätter, die dem Laub der Freesien gleichen, jedoch etwas zierlicher sind. Die lebhaft roten Blüten haben eine dünne, bis zu 3 cm lange Röhre und einen ausgebreiteten Blütenkranz von 2-3 cm Durchmesser. Sehr apart ist der dunkler gefärbte Fleck an der Basis der 3 äußeren Perianth-segmente. Bis zu 12 Blumen an einem Stiel, die Knollen sind nicht winterhart.

**Blütezeit Juli bis August | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art-Nr.	Sorte		Höhe cm	Größe
08489	<b>laxa</b> (cruenta), leuchtend rot		20-25	I



Anemone St. Brigid Mischung



Anemone hupehensis



Anemone sylvestris

## Arisaema (Feuerkolben)

sind eine Gruppe von über 100 Arten, meist im Himalaya, in China, Japan und Nordamerika beheimatet. Nicht alle sind winterhart, aber eine Reihe von ihnen ist doch auch bei uns langlebig. Sie müssen 15-20 cm tief gepflanzt werden; lichter Schatten ist in der Regel der bestgeeignete Standort.

**Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08502	<b>nepenthoides</b> erregt schon früh im April-Mai die Aufmerksamkeit, wenn die durchscheinenden hell bräunlichen Stiele erscheinen, die innerhalb weniger Tage förmlich in die Luft schießen. Die beiden Blätter entfalten sich später. Die Spatha ist dreigelappt, der mittlere Lappen krümmt sich wie ein Schlangenkopf über den Kolben. <b>Die Blütezeit ist von Mai bis Juni.</b> Sorgfältige Behandlung – möglichst trockene Lagerung – im Winter ist wichtig	40	I
08506	<b>speciosum</b> , außerordentlich attraktiv mit kapuzenähnlicher Spatha, außen grünlichpurpur, innen dunkelviolett mit helleren Streifen. Eigenartig der Kolben, der in eine lange, spitze, oft in sich gedrehte Spitze ausläuft. <b>Blütezeit ist von April bis Mai</b>	40-50	I
08510	<b>triphylum</b> blüht im Juni bis Juli mit einer grünen, innen purpur gestreiften Spatha mit kapuzenförmiger Spitze, die den dunkelbraunen Kolben beschirmt. Auch unter dem Namen „Jack in the pulpit“, „Hans auf der Kanzel“ bekannt. Sehr winterhart	30	I

## Arum (Aronstab)

Der Aronstab ist in Mitteleuropa und im Mittelmeergebiet bis Persien verbreitet und ist bei uns noch wenig bekannt. Angepflanzt in unseren Gärten besitzt der Aronstab 3 Schmuckwerte: den sich im März entwickelnden schön gezeichneten Laubbusch, dann den callahaften Blütenstand, sowie den feurigroten Fruchtstand im Herbst.

**Blütezeit ist September bis Oktober | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08494	<b>italicum</b> hat im Mai dunkelgrüne, glänzende Blätter und im Herbst prächtige orangefarbene Beeren-Fruchtstände. Winterhart. Holländischer Anbau.	40-60	I

## Astilbe (Prachtspieren)

Astilben wachsen an halbschattigen bis schattigen Standorten und bevorzugen einen kühlen, frischen, feuchten Boden. Verrotteter Pferdemist (kein Kuhdung!) wirkt Wunder. Beim Umpflanzen, auch im Herbst möglich, teilt man die klumpenartigen Wurzelstöcke mit dem Messer. Man kann die Wurzelstöcke auch einschlagen und dann im Frühjahr pflanzen. Das hübsche, zart gefiederte Laub wirkt vor und nach der Blüte sehr apart.

**Blütezeit ist von Juli bis August/September | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
<b>japonica Hybriden</b> , frühblühende, niedrige Sorten, bestens geeignet für Töpfe und 2-Liter-Kübel			
08484	– <b>Ellie</b> , reinweiß	50	I
08485	– <b>Montgomery</b> , dunkelrot	50	I
08486	– <b>Rheinland</b> , rosa	50	I



*Anomatheca laxa*



*Arisaema nepenthoides*

Bitte unbedingt die  
verschiedenen  
Liefertermine beachten!



*Arisaema speciosum*



*Arisaema triphyllum*



*Arum italicum*



*Astilbe japonica-Hybride Ellie*



*Astilbe japonica-Hybr. Montgomery*



*Astilbe japonica-Hybride Rheinland*

## Babiana (Pavianblume)

ist in Südafrika beheimatet und bei uns noch relativ unbekannt. Wegen ihrer Schönheit verdient sie aber eine größere Verbreitung. Sie muss an einem **sehr warmen** Platz stehen und etwa 15-20 cm tief gepflanzt werden, um sich voll entfalten zu können. Im Freiland ist kräftiger Winterschutz erforderlich! In kühlerem Klima sollte man die Topfkultur vorziehen.

**Blütezeit ist Juli / August | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08498	<b>stricta Mischung</b> hat Blütenähren mit 4 bis 5 kelchartigen, süß duftenden Blüten von 2-3cm ø in überwiegend blauen, aber auch violetten und rosafarbenen Farbtönen.	30	5/+

## Knollenbegonien

Eine alte Kulturpflanze, die viele Höhen und Tiefen in der Beliebtheit durchgemacht hat. Durch ihren Farbenreichtum und ihre Farbenvielfalt hat sie dennoch viele Bewunderer. Die Knollenbegonie wird als Topf- oder Balkonpflanze, ebenso als Beetpflanze sehr geschätzt. Die Begonie wächst aus der Oberseite der fast runden Knolle, die fleischigen Triebe sind sehr empfindlich und vertragen keinen Frost. Sie wachsen zwar auch in der Sonne, aber fühlen sich an einem leicht halbschattigen Platz am wohlsten.

Knollenbegonien pflanzt man im Frühjahr, nach den letzten Frösten in gut humusreiche Erde. Für eine frühe Blüte kann man sie auch ab Februar / März in einem Zimmer oder Gewächshaus bei einer Temperatur von 18-20 ° C vortreiben. Dazu legt man sie mit der hohlen Seite nach oben in eine humusreiche Erdmischung + Torf + Sand – gut feucht halten. Nachdem die ersten Triebe erschienen sind, umpflanzen und langsam an die Außenluft gewöhnen. Nach den letzten Nachtfrosten auspflanzen und alle 2-3 Wochen düngen.

**Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
<b>Gefüllte Riesenblumige Knollenbegonien</b>			
00050	<b>dunkelrot</b>	25	5/6
00070	<b>gelb</b>	25	5/6
00110	<b>rosa</b>	25	5/6
00120	<b>weiß</b>	25	5/6

**Gefüllte Hänge/ Ampel-Begonien**, sie bilden reichverzweigte nach allen Seiten herabhängende, 40 cm lange Triebe, dicht mit Blumen bestückt.

00220	<b>gelb</b>	25	5/6
00235	<b>rosa</b>	25	5/6
00225	<b>rot</b>	25	5/6
00245	<b>weiß</b>	25	5/6

## Begonia – tuberhybrida F1 Non-Stop

Große gefüllte Blumen, frei über dem Laub blühend. Idealer Pflanzenaufbau, früh in der Blüte, überaus reichblühend, bestens geeignet für Beete und Rabatten.

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
00505	<b>apricot</b> , goldrosa bis aprikosenfarbig	15	4/5
00510	<b>gelb</b> , metallisch glänzendes Laub	15	4/5
00520	<b>leuchtrot</b> , sehr apart	15	4/5

## Begonia Crispa marginata – einfachblühend

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
00210	gelb mit roter Umrandung	25	5/6
00200	weiß mit roter Umrandung	25	5/6

## Gefüllte Begonia – Liebhabersorten

Für Töpfe, Kübel und Schalen.

Blütezeit von Juli bis Oktober

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
00277	<b>Champagne</b> , champagner-farben, gut gefüllte, hängende Blumen	25	3/5
00281	<b>Rosebud</b> , rosa / weiße Hybride, gefüllt blühend	20	5/6



Babiana stricta Mischung



Begonia Non Stop apricot



Begonia Non Stop gelb



Begonia Non Stop leuchtrot



Begonia crispa marginata



Gefüllte Begonia Champagne

## Bessera (Korallentröpfchen)

Das Korallentröpfchen ist ein hübsches Gartengewächs, stammend aus Mexiko. Die zwiebelartige Knolle treibt schmale Blätter mit einem 60-70cm hohen drahtigen Blütenstiel, von dessen Spitze ein Kranz von 10-15 zarten Blumen herabhängt. Bei uns nur an geschützten Stellen in Weinbaugebieten winterhart.

Man pflanzt die Knollen ca. 10cm tief in nahrhafte, sandige Erde, während des Wachstums gut wässern. **Blüte erfolgt im August/September.** Wenn das Laub verwelkt ist, beginnt die Ruhezeit, es darf dann nicht mehr gegossen werden. Im Freiland Regenschutz durch Glasplatte oder ähnliches geben. An einem guten Standort bilden sich Horste mit schönen Schnittblumen.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08512	<b>elegans</b> , rot bis purpurrot gefärbte, 3-4 cm große Blüten, im Blüteninneren weißes Zentrum.	60	5/+



*Bessera elegans*



Gefüllte Begonia Rosebud



*Begonia pendula* Prachtmischung

## Bletilla (chinesische Erdorchidee) ○ - ● ^

Benötigt einen sonnigen bis halbschattigen Standort, der im Frühling genügend feucht aber gut drainiert sein muss, sowie einen humosen Boden. In sehr rauem Klima ist eine Kultur im Topf ratsam, den man im Sommer in die Beete einsetzt. 3-5 leicht nickende Blüten in Trauben, nicht winterhart.

**Blütezeit im Juli bis August | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08514	<b>kuchibeni</b> , weiß mit einem Hauch von rosa, die zentrale Lippe leuchtet ausgeprägt rosa	20	I
08516	<b>striata (Bletia hyacinthina)</b> , eine Erdorchidee, in leuchtend purpurkarmin bis violettpurpur. Nicht winterhart	25	I
08522	<b>striata Alba</b> , ist wie Bletilla striata, blüht jedoch reinweiß	25	I

**Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten!**

**nicht lieferbar in die Schweiz!**



*Bletilla kuchibeni*



*Bletilla striata Alba*



*Bletilla striata*

**Brodiaea** siehe **Triteleia**

**Calla** siehe **Zantedeschia**

### **Chasmanthe** (Rachenlilie)

Diese schöne schlanke und hohe Pflanze ist in Südafrika beheimatet. Sie bringt im Kalthaus gezogene schöne Schnittblumen oder wirkt sehr apart im sonnigen Sommer-Staudenbeet. Diese Gattung ist nicht winterhart. Aus der abgeflachten Knolle entwickelt sich ein schlanker Blütschaft mit einer Rispe oder Ähre.

Die Pflanzen können im Zimmer vorkultiviert und im Frühling ins sonnige Freiland gepflanzt werden, wobei das Überwinterungssubstrat nicht ganz austrocknen darf. Beim Topfen sollte die Knolle ca. 5 cm mit Erde bedeckt sein.

**Blütezeit: Juni bis Juli | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08818	<b>floribunda</b> , orangerot	150	I

### **Commelina** (Knollige Tagblume)

Ständig neu erscheinende Knospen sorgen für einen langen Blütenflor von Juni bis in den Herbst, wobei die einzelnen Blüten aber nur für einen Tag blühen.

Sie lieben volle Sonne, einen humosen und lockeren Boden. Die Wurzelknolle kann ab März im Topf vorgetrieben werden; nach dem sich die Triebe zeigen, kühler stellen und nach den Eisheiligen ins Freiland pflanzen. Immer regelmäßig gießen. Im Herbst Triebe auf 2 cm zurückschneiden und mit Erdballen bei 6° C überwintern.

**Blütezeit: Juli-September | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08811	<b>coelestis</b> , leuchtendblau	50	I



*Chasmanthe floribunda*



*Commelina coelestis*



*Convallaria majalis*

## Convallaria (Maiglöckchen) ♂ D

Wir liefern nur beste Qualität aus deutschen Spezialkulturen.

Liefertermin Februar bis März

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08816	<b>Pflanzkeime</b> , weiß (25 Stück / Bund)	20	I

schwächere Sortierung ohne Blume

### a) Freiland Pflanzung:

- möglich im Oktober und März
- Blüte erfolgt erst ab dem 2. Jahr

### b) Topfkultur:

nicht geeignet

## Crinum (Hakenlilie) ^

Eine prächtige Zwiebelpflanze mit amaryllisähnlichen Blüten. Kultur im Frühbeet empfehlenswert. Im Freiland sehr guter Winterschutz erforderlich. So tief pflanzen, dass nur die Spitze des schlanken Wurzelhalses aus dem Boden ragt.

Blütezeit: Juli-September | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08822	<b>cintho Alfa</b> , weiß, rot gestreift. <b>Blütezeit: August / September</b>	80-100	I
08821	<b>powellii</b> , hellrosa Blüten. Muss viele Jahre ungestört stehen, um sich von Jahr zu Jahr immer schöner zu entwickeln. Besonders wirkungsvoll zusammen mit Canna, Ziergräsern usw.	60	20/24
08824	<b>powellii album</b> , die weiße Varietät von Crinum powellii, <b>duftend</b>	60	20/+



Crinum cintho Alfa



Crinum powellii



Crinum powellii album

## Crocsmia (Montbretie, Sternschnuppen)

Die Crocsmia oder auch Montbretie genannt, ist eine vielbeliebte Zierpflanze, die einen vollsonnigen Standort liebt. Winterschutz erforderlich. Pflanzungen nach Mitte April beeinflussen das Blühergebnis nachteilig. Pflanztiefe ca. 4 cm, liebt Sand, Kleie oder leichten Tonboden.

**Blütezeit: August/September | Liefertermin ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
08837	<b>crocsmiiflora Babylon</b> , orange	60-80	6/+
08840	<b>crocsmiiflora Emily McKenzie</b> , orangerot mit rotem Fleck, bes. wertvolle Schnittblume	60-80	7/+
08842	<b>crocsmiiflora Lucifer</b> , feuerrot	80-100	8/10
08844	<b>crocsmiiflora Norwich Canary</b> , gelb	80-100	6/+
08850	<b>crocsmiiflora großblumige Prachtmischung</b>	80-100	6/+



*Crocsmia crocsmiiflora Babylon*



*Crocsmia crocsm. Emily McKenzie*



*Crocsmia crocsmiiflora Lucifer*



*Crocsmia crocsm. Norwich Canary*



*Cyclamen coum album*



*Cyclamen hederifolium*

## Cyclamen (Alpenveilchen)

Cyclamen gehören zu den Urpflanzen unserer Erde. Es gibt ca. 17 Arten, die im südlichen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum beheimatet sind. Die meisten Arten wachsen in ihrer Heimat an halbschattigen Stellen von Felswänden, in Laub- und Nadelholzwäldern, oft auch im Steinschotter in praller Sonne.

Cyclamen verlangen einen halbschattigen Standort, humosen und kalkhaltigen Boden. Die Knollen sollten nach dem Pflanzen mit 3-5 cm Erde abgedeckt sein. Im Winter gegen Frost und kalte Winde abdecken. Um sich gut zu vermehren, sollten die Pflanzen über Jahre hinweg an einem Ort stehen.

**Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten!** – Nicht lieferbar in die Schweiz –  
**Liefertermin bei Knollen ab Mitte Februar**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
<b>Herbstblühende Arten</b>			
08866	<b>cillicicum</b> , hellrosa. <b>Blütezeit: September-November</b>	10-12	13/+
08871	<b>hederifolium (neapolitanum)</b> , hellrosa mit silberfarbig gezeichneten efeuähnlichen Blättern. Bewurzelung nur von der Oberseite aus. <b>Blütezeit: September-November, duftend</b>	10-15	15/20
<b>Frühjahrsblühende Arten</b>			
08868	<b>coum (orbiculatum)</b> , blüht sehr zeitig ab etwa Januar mit hell karmesinroten Blüten, während die dunkelgrünen, weiß marmorierten Blätter bereits im Herbst erschienen sind. Liebt feuchten Waldboden. <b>Blütezeit: Januar-März</b>	5-10	10/+
08869	<b>coum Album</b> , weiß blühend, <b>Blütezeit: Dezember-März</b> getopft, Liefertermin ab Ende März	10	T9



Cyclamen coum ssp coum



Kaktus-Dahlie Berner Oberland