

Paeonien (Pfingstrose) D

Paeonien benötigen lehmhaltige Böden, die gut mit Nährstoffen versorgt sind, und einen vollsonnigen Standort. Am richtigen Platz können diese beliebten Stauden Jahrzehnte stehen, ohne dass die Blühwilligkeit nachlässt, müssen aber gut gedüngt werden, bis zu 100 gr. Blaukorn-Volldünger pro m².

Paeonien dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, insbesondere auf schweren Böden sollten die Knospen nur halb im Boden verborgen und beim Pflanzen nur leicht mit Erde bedeckt sein.

Wir liefern Teilpflanzen mit 2/3 Augen.

Liefertermin ab Mitte Februar

Paeonien *lactiflora* (Chinesische Pfingstrose)

Die chinesischen Pfingstrosen entwickeln sich sehr langsam. Erst nach mehreren Jahren nehmen die Blüten ihre typische Form an.

Aus einem roten Austrieb entwickeln sich stark belaubte Horste mit bis zu 1 m hohen starken Blütenstielen mit mehreren Blütenknospen, die nacheinander aufblühen. **Ideal zum Schnitt geeignet.**

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10082	Bowl of Beauty , fuchsienrosa, japanische Blüte	100	VI	I
⑨ 10080	Coral Charm , großblumige, halbgefüllte Blüte, sehr interessant durch ihr reichhaltiges Farbenspiel, von korallenrosa, lachs bis hin zu creme	90	VI	I
10083	Festiva Maxima , gefüllte weiße Blüte, in der Mitte rote Petalen, sehr früh blühend	100	VI	I
10085	Kansas, Schnittsorte , gefüllte leuchtendrote Blüte, früh blühend	100	VI	I
10090	Primevére , weiß mit gelber Mitte, japanische Blüte	110	VI	I
10087	Sarah Bernhardt , gefüllte rosa Blüte, spät blühend	100	VI	I



Oxalis Rubra



Oxalis triangularis Mijke

Papaver orientale (Türkischer Mohn)

Riesige Blüten mit leuchtenden Farben, starken Knospen auf hohen Schäften, über großen, fiederteiligen, behaarten Blättern kennzeichnen den großen Gartenmohn.

Sie benötigen um ihre langen Pfahlwurzeln gut entwickeln zu können Schuttreiche, warme, lockere Böden.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte		Höhe cm	Blütezeit	Größe
10070	Effendi , orange, gewellte Blüten, standfest,	getopft	70	VI-VII	1L
10072	Patty's Plum , violettrot, aparte Farbe,	getopft	70	VI-VII	1L
10074	Perry's White , weiß, am Grunde schwarz, sehr attraktiv,	getopft	80	V-VI	1L

Phlox (Staudenphlox)

Der Staudenphlox gehört zur Familie der Sperrkrautgewächse. Er ist eine mehrjährige krautige Pflanze und beliebte Zierpflanze.

Der Staudenphlox kommt ursprünglich aus Nordamerika und wächst dort vorwiegend in niederschlagsreichen Waldgebieten.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte		Höhe cm	Blütezeit	Größe
® 10106	paniculata Grenadine Dream , leuchtend rot, Schnittphlox	getopft	90	VI-VIII	T9
® 10107	paniculata Pina Colada , weiß, Schnittphlox	getopft	90	VI-VIII	T9



Paeonien lactiflora Bowl of Beauty



Paeonien lactiflora Coral Charm



Paeonien lactiflora Festiva Maxima



Paeonien lactiflora Kansas



Paeonien lactiflora Primevère



Paeonien lactiflora Sarah Bernhardt



Papaver orientale Effendi



Papaver orientale Patty's Plum



Papaver orientale Perry's White



Phlox paniculata Grenadine Dream



Phlox paniculata Pina Colada

Pleione (Tibetorchidee) ○ ^

Zauberhafte, kleine Erdorchidee mit bis zu 10 cm großen Blüten.

Artenschutzrechtliche Bestimmungen beachten! | Nicht lieferbar in die Schweiz!

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10098	bulbocodioides , blüht im Mai mit bis zu 8 cm großen Blüten, bei denen die abstehenden Blüten- und Kelchblätter violett bis rosa gefärbt sind. Die Lippe ist weiß, am Rand gefranst und hat innen rötliche Flecken	10	V	I
10100	formosana , stammt, wie der Name schon sagt, aus Formosa. Die sehr große Blüte (bis 10 cm Ø) ist magentarosa, die Lippe cremeweiß bis gelb mit hellrötlich-braunen Punkten und Strichen	15	IV-VI	I
10101	formosana Alba (Snowcap) , weiße Varietät zu Pleione formosana. Geeignet für den Garten, wie auch für Töpfe, bedingt winterhart. Verlangen einen hellen Standort aber keine volle Sonne	15	V-VII	I
① 10105	praecox , rosa mit weißer Lippe, die rosa und gelb gesprenkelt ist	15	V-VII	I

Polianthes (Tuberose) D

Leichte Kultur in Töpfen oder auf Beeten, auch gut für Freiland geeignet. Elegante weiße Schnittblume.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10108	tuberosa „The Pearl“ , stammt ursprünglich aus Mexico und ist nicht winterhart. Sie eignet sich vorzüglich zur Topfkultur; nur an sehr warmen, geschützten Standorten ist eine Freilandpflanzung vorstellbar. – Man legt die eiförmigen Zwiebeln einige cm tief in gute humose Erde und stelle die Töpfe bei 12-15 ° C auf. Erst gießen, wenn der Blütentrieb erscheint, dann aber regelmäßig düngen und wässern. – Auf dem etwa 50 cm hohen Schaft sitzen dann etwa 5 Monate nach der Pflanzung mehrere trichterförmige, wachsartige weiße Blüten, die insbesondere abends stark duften . – Da die abgeblühten Zwiebeln in unserem Klima nicht ausreifen, lohnt eine Weiterkultur nicht	50-80	VII-VIII	12/+

Primula pruhoniciana (Julie) (Bergkissenprimel)

Diese reichblühende Kissenprimel breitet sich allseitig kriechend, rasenartig auf absonnigen Flächen mit frischen Böden aus.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe	
10117	amarantrot ,	getopft	10	III-VI	T9



Pleione formosana



Pleione bulbocodioides



Pleione formosana Alba



Pleione praecox



Polianthes tuberosa „The Pearl”



Primula pruhoniciana amarantröt

Ranunkeln (Hahnefuß) ☞

liefern wertvolle Schnittblumen sowohl in der Kalttreiberei als auch im Freilandanbau, gleichmäßig gut feucht halten.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10125	päonienblütige , großblumige Prachtmischung	25	V-VI	6/7

Rhodohypoxis baurii (Garten-, Grasstern, südafrik. Knollenpolster) ○ △ ∨

kommt aus Südafrika und wächst dort im Grasland. Die Blätter sind flach, gerade und sehr behaart; die sternförmigen Blüten haben einen Durchmesser von etwa 4cm und folgen einander von Frühsommer bis Herbst. – Topfkultur empfehlenswert, dabei im Winter ziemlich trocken und frostfrei halten, aber ab Frühjahr bis nach der Blüte gut wässern. Bodendeckend / horstbildend, möglichst in kleinen Tuffs (bis 10 Stück) pflanzen, reiche Blüte.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10162	purpurrot	10	VI-IX	I
① 10163	rosa	10	VI-IX	I
① 10164	weiß	10	VI-IX	I



Ranunkeln päonienbl. Prachtmischung



Rhodohypoxis baurii purpurrot



Rhodohypoxis baurii rosa

Roscoea (Schein- oder Ingwerorchidee) △ ^

Roscoea sollten vorwiegend in größeren Steingärten gepflanzt werden, da sie bei gutem Standort kräftige Pflanzen entwickeln. Der Platz sollte halbschattig bis leicht sonnig sein und eine gute Drainageschicht haben.

Gepflanzt werden die flachwurzelnden Rhizome 10-15 cm tief in sandig-lehmigen Böden, mit Wald- oder Lauberde vermischt. Im Winter benötigen sie als Frostschutz eine dicke Laubschicht.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10171	cautleoides , hat große leuchtend gelbe, zweilappige Blüten in mehrblütigen Ähren an langen Stielen über blaugrünen, länglich-lanzettlichen Blättern	40-60	VI	I
10176	purpurea , ist eine recht unempfindliche und harte Varietät. Die purpurfarbenen Blüten erscheinen im August-September nacheinander, wenn die Blätter bereits entwickelt sind	30-40	VI-VII	I



Rhodohypoxis baurii weiß



Roscoea cautleoides



Roscoea purpurea

Rudbeckia (Sonnenhut)

Rudbeckia sind attraktive Prachtstauden, die in keinem Garten fehlen sollten. Diese wertvollen Schnittblumen stammen aus Auen und Feuchtgebieten der USA. Alle Rudbeckien bevorzugen ausreichend feuchte, nährstoffreiche Böden. Bei Trockenheit sollte gewässert werden, ansonsten sind sie recht anspruchslos.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10178	Maxima , gelb – charakteristisch ist der hohe, schwarze Kelch gel in der Mitte der großen Blüte, liebt Solitärstandort.	120 - 150	VII - IX	1L
	getopft			
10179	Occidentalis Green Wizard , die hellgrünen Kelchblätter liegen wie ein Stern um das große kegelförmige Herz, das beinahe schwarz ist.	80 - 90	VI - VIII	1L
	getopft			

Sanguinaria (Blutwurz) ☾

ist eine schöne, aus dem östlichen Nordamerika stammende Waldpflanze mit weißen, anemonenartigen Blüten, die vor oder mit den blaugrünen, gelappten, nierenförmigen Blättern erscheinen; diese ziehen im Laufe des Sommers ein.

Gut geeignet zur Unterpflanzung unter Bäumen und Sträuchern.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10190	canadensis , weiß	15 - 20	IV - V	I



Rudbeckia Maxima



Rudbeckia Occid. Green Wizard



Sanguinaria canadensis

Scadoxus (Blutblume) – bisher Haemanthus

Aus dem tropischen Afrika stammt diese sehr attraktive Art. Ihre Zwiebel bringt auf einem kräftigen Stiel große, kugelförmige Dolden von tiefroter Farbe hervor.

Die 3-4 ovalen und 15-25 cm langen Blätter, die gleichzeitig mit oder nach der Blüte erscheinen, entfalten sich an einem eigenen Stamm neben dem Blütenstand.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10200	multiflorus ssp. multiflorus , karminrot.	50	VII-VIII	14/+

Sparaxis (Zigeunerblume, Dreifarbiges Fransenschwertel)

Ein reizendes Schwertliliengewächs aus Afrika für Topf- und Freilandkulturen.

Behandlung wie Ixia.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10210	tricolor , wird in Mischung geliefert. Die Pflanzen bringen gleichzeitig mehrere leuchtende rosa bis purpurfarbene, sehr hübsche Blüten.	40	VI-VII	5/+

Sprekelia (Jakobsllilie)

Bevorzugt sonnigen Standort bei Pflanzung ab Mitte Mai. Die Zwiebel sollte mit ca. 3 cm Erde bedeckt sein. Auch als Topfpflanze wirkungsvoll. Nicht winterhart.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10218	formosissima , hat eine orchideenähnliche, bis 12 cm große, kräftig rote Blüte. Sie ist ohne Schwierigkeiten als Topfpflanze oder sogar auf einem Hyazinthenglas zu ziehen. Vor Frostbeginn Zwiebeln herausnehmen, trockenwarm überwintern.	30	VI	14/16



Scadoxus multiflorus



Sparaxis tricolor



Sprekelia formosissima